

DAMIZLIK KÜMESLERDE SALMONELLA KORUMA PROGRAMI

AMAÇ:

Altlıkta Salmonella spp. grubu bakterilerin baskılanması, bağırsakta probiyotiklerle salmonella etkenlerinin epitel hücrelerine tutunmasını dolayısıyla altlık – kursak – barsak döngüsünün kırılarak etkenin sürüde yayılmasının kısıtlanması, görülme sıklığı (insidens), hastalık yapma potansiyeli (virülens) ve etken sayısının (log.) azaltılmasıdır. Altlıkta salmonella sayısının laboratuvarında bulunamayacak sayılarda tutulması.

ÜRÜNLER:

SİM BROLİT Altlık Kültürü

AMAÇ; Altlık asitlendirici, bakteri ve küf etkenlerine karşı koruyucu, amonyak giderici

UYGULAMA; 1000 m² kümese 2 litre SİM BROLİT 20 litre suya tamamlanıp altlığa sprey olarak uygulanır. Her 3-4 haftada bir SİM BROLİT uygulaması tekrarlanır.

SİM LAC Koruyucu Starter Probiyotik, Bağışıklık Güçlendirici, Anti-stress

AMAÇ; Hayvanın bağırsağını enterite karşı korumak, hücrel bağışıklığı uyarmak, mukusu azaltmak.

UYGULAMA; 3-4 haftada bir, iki günlük içme suyuna 0,5 lt/ton SİM LAC sürü ömrü boyunca kullanılır.

1000 m² Damızlık kümesi için aylık kullanılacak miktarlar;

ÜRÜN	MİKTAR	UYGULAMA	DOZ
SİM BROLİT	2 lt	Altlık Sprey	1/10 – 1/50 solüsyon
SİM LAC	max 2 lt	iki günlük içme suyuna	500 ml/ton
SİM NUTRİ BAC	7,5 lt	İçme suyuna her gün	250 ml/5000 hayvan

NOT:

- Altlık çok kuru ise SİM BROLİT 1/50'ye kadar sulandırılabilir.
- Sprey uygulaması dezenfektan bulaşmamış bir ekipmanla yapılmalıdır.
- Altlıkta salmonella şüphesi varsa üç gün ara ile en az iki uygulama yapılmalı, uygulama yapılan günlerde içme suyu ile SİM LAC takviye edilmelidir.
- **Salmonella taraması uygulamadan üç gün sonra yapılabilir.**